



PLAN ORIENTATIVO ABONADO CULTIVO DEL NOGAL

ESTADIOS FENOLÓGICOS	BROTACIÓN	APARICIÓN FLORES	CUAJADO	CRECIMIENTO VEGETATIVO	CRECIMIENTO DEL FRUTO	PRE-COSECHA	POST-COSECHA
Abono orgánico con NPK y microelementos							FORCE-ORGANIC 1200Kg/ha
Abono orgánico nitrogenado	FRUTELÁ-LA N8 200Kg/ha			FRUTELÁ-LA N8 200Kg/ha			
Favorece el enraizamiento y mejora la absorción de nutrientes	FORCEX-ECO 2l/ha						
Solución potásica neutra al 40%				FORCE-K ECO 40-60 l/ha (en 3-4 aplicaciones)			
Corrector de carencias multiple				FORCE-MIX ECO 6Kg/ha (3 aplicaciones)			
Estimulador metabólico de la calidad total del fruto	COTA-ECO 400cc/hl		COTA-ECO 400cc/hl (3 aplicaciones)				
Aminoácidos 85% + Nitrógeno 13%	FORCE-NITRO ECO 100 g/hl						FORCE-NITRO ECO 100 g/hl
Corrector de carencias multiple	MAXIMICRO-ECO 500cc/hl					MAXIMICRO-ECO 500cc/hl	
Extracto de algas Ascophyllum nodosum 27%				FORCE-MAR ECO 200cc/hl			

	Momento de aplicación	Objetivo	Producto	Dosis/aplic/ha	N. aplicaciones
	APARICIÓN FLORES	Mejorar la floración y enl cuajado de las flores	COTA ECO + FORCE-NITRO ECO + MAXIMICRO ECO	400cc/hl + 100g/hl + 500cc/hl	1
	CRECIMIENTO VEGETATIVO	Mejorar el desarrollo del fruto y aportar vigor a la planta	COTA-ECO + FORCE-MAR ECO	400cc/hl + 200cc/hl	1
	CRECIMIENTO DEL FRUTO	Potenciar el desarrollo del fruto	COTA-ECO + MAXIMICRO-ECO + FORCE-MAR ECO	400cc/hl + 500cc/hl + 200cc/hl	1



CARENCIA DE POTASIO

La deficiencia de potasio ocasiona un retardo en el crecimiento y baja productividad. Los árboles muestran lento crecimiento y hojas más pequeñas.

La deficiencia de potasio se manifiesta como una quemadura en los márgenes de las hojas. Inicia con un color verde pálido, posteriormente se vuelve acorchado y se seca.



CARENCIA DE MAGNESIO

El nogal sensible a la deficiencia de este elemento. La deficiencia de manganeso en nogal ocasiona caída prematura de las hojas y retraso en el crecimiento. No hay crecimiento en las yemas terminales.

La deficiencia de manganeso en nogal se manifiesta con una clorosis internervial. Los síntomas son más acusados al comienzo de la primavera. Afecta la cara sur del árbol.



CARENCIA DE HIERRO

La deficiencia de hierro en nogal ocasiona una reducción en el tamaño de las hojas y pérdida de la calidad del fruto.

Las nervaduras se mantienen verdes y el resto de la hoja toma un color amarillo.

Frutos pequeños, piel sueva y falta de color.

PLAGAS



POLILLA DE LA MANZANA



PULGON VERDE



ZEUZERA

ENFERMEDADES



CARPOCAPSA



POBREDUMBRE



ANTRACOSIS



Camí les Mines, 46780 Oliva, València
Lunes a Viernes, 8:30AM-18:00PM
Oficina: 962 839 179

info@fertilizantesecoforce.es

www.fertilizantesecoforce.es